


Държави, засегнати от АЧС в Европа



Карта на районите, в които АЧС е налична при прасета и/или диви свине (състояние към 08.07.2022 г.).

За актуализиран списък на заразените държави или за повече информация относно АЧС:

<http://www.favv-afsca.fgov.be/ppa/>

<https://www.natuurenbos.be/afrikaansevarkenspest>

<http://www.wallonie.be/fr/actualites/mesures-de-lutte-contre-la-peste-porcine-africaine>



Африканската чума по свинете се разпространява в Европа! Нека се борим заедно!

Африканската чума по свинете (АЧС) е силно заразна вирусна болест по свинете и дивите свине.

Заболяването се разпространява в Европа.

То се появи в Белгия през септември 2018 г. при диви прасета и беше успешно изкоренено (което изискваше огромни усилия и струваше милиони евро), но рискът от повторна поява е много голям, опасността е реална за Белгия!

Като свиневъд сте длъжни да вземете всички необходими мерки, за да предотвратите появата на болестта във Вашата ферма!

В цялата страна трябва да предприемете действия, като:

1. съобщавате за всяко подозрение директно на Вашия ветеринарен лекар,
2. стриктно спазвате мерките за хигиена и биосигурност във Вашата ферма,
3. проверявате всеки, който влиза или работи във фермата Ви,
4. извършвате задължителната годишна оценка на биосигурността от Вашия ветеринарен лекар и прилагате плана за действие.

Всички мерки, които трябва да се спазват, могат да бъдат разгледани на адрес

<http://www.favv-afsca.fgov.be/ppa/>



Заболяването

АЧС е **силно заразна** вирусна болест, която може да засегне **прасетата и дивите свине**. Няма типични симптоми на АЧС. Всяка необичайна смъртност трябва да доведе до съмнение за АЧС.

Заболяването може да има 3 форми:

остра форма:

- висока **температура**, анорексия, диария
- летаргия, **склонност към струпване едно върху друго**
- хематологични заболявания, придружени от **подкожни кръвоизливи и жълтеница**
- бърза смърт (2-3 седмици) и **смъртност**, която може да достигне 100%

подостра форма: по-малко интензивни симптоми, по-ниска смъртност и смърт в рамките на по-дълъг период.

хронична форма: груби признаци на заболяване, които се развиват в продължение на няколко месеца, като например

- аборти, малки приплоди, изостанали прасенца
- слаба ефективност при уговяване



Източник: FLI



Кожен обрив

Източник: JM Gourreau

Основни пътища на предаване



АЧС може да се предава чрез:

- **контакт със заразени прасета или диви свине (включително трупове или вътрешности)**
- **месо/колбаси** от заразени животни
- **замърсени предмети**, като обувки, дрехи, превозни средства, оборудване
- хора, които са имали контакт със заразени животни или са били на заразени места

Вирусът остава заразен дълго време в мъртви животни, в околната среда и в месо/колбаси от заразени животни (до 105 дни във вътрешностите и кръвта и до 300 дни в изсушено месо!!!).

**АЧС не се предава на хората.
Няма риск за човешкото здраве.**

3 стълба за борба с АЧС

Превенция

Няма ваксина (все още) срещу АЧС. Единственият начин да се предотврати проникването на болестта в стопанството е да се прилагат мерки за хигиена и **биосигурност***, като например:

- използване на хигиенни мерки със заключване, програма за борба с вредителите
- спазване на хигиенни мерки за всички лица, които влизат в стопанството
- поставяне на нови прасета под карантина
- да не се хранят прасетата с кухненски отпадъци
- предотвратяване на контакт между прасета и диви свине
- да се забрани достъпа до стопанството на всяко лице, превозно средство или оборудване, което е било в контакт с диви свине или е било в рисковата зона през предходните 72 часа
- тези мерки е особено важно да се спазват, когато се наемаат хора, които идват или са пребивавали в рисковата зона (сезонни работници)
- за прасета с открит двор:
 - да има двойна ограда, за да се предотврати контакт с диви свине
 - да се поставят знаци, предупреждаващи минавачите, че храненето на прасета е забранено

***Не се колебайте да се консултирате с контролните точки, определени за одита на биосигурността**
https://www.favv-afscs.be/professionnels/productionanimale/animaux/circulaires/documents/20210531_circ_instructionveterinairesanalyseederisque_FR_v1.pdf

Ранно откриване

Винаги се свързвайте с ветеринарния си лекар, когато забележите симптоми, подсказващи АЧС или необичайна смъртност.

Когато се открият признаци на заболяване при група прасета и се налага лечение, в лабораторията трябва да се изпратят и кръвни проби за изследване за АЧС.

Винаги е по-добре пробата да се изследва твърде често, отколкото недостатъчно!

Контрол

Няма лечение за АЧС. Контролът се осъществява чрез мерки за избиване на животни и ограничения на движението.

Предприетите мерки имат за цел да изолират огнището възможно най-бързо, за да се предотврати разпространението на болестта и да се ликвидира вирусът. Тези мерки са определени от законодателството на ЕС и включват:

- клане на всички прасета в огнището на заразата и унищожаване на труповете
- почистване и дезинфекция на заразения стопанство
- създаване на ограничителни зони около огнището на заразата, в които движението на животни, хора и стоки е забранено или ограничено