


Kraje europejskie, w których stwierdzone zostały zakażenia afrykańskim pomorem świń



Mapa obszarów, w których afrykański pomór świń występuje u świń i/lub dzików (sytuacja na dzień 8.07.2022 r.).

Aktualizowana lista krajów, w których stwierdzono zakażenia i dodatkowe informacje na temat afrykańskiego pomoru świń:

<http://www.favv-afsca.fgov.be/ppa/>

<https://www.natuurenbos.be/afrikaansevarkenspest>

<http://www.wallonie.be/fr/actualites/mesures-de-lutte-contre-la-peste-porcine-africaine>



Afrykański pomór świń rozprzestrzenia się w Europie! Walczmy z nim wszyscy wspólnie!

Afrykański pomór świń (ASF) jest wysoce zaraźliwą chorobą wirusową świń i dzików.

Choroba rozprzestrzenia się obecnie w Europie!

Jej obecność została stwierdzona po raz pierwszy wśród dzików w Belgii we wrześniu 2018 r., jednak została wyćpiona (co wymagało ogromnych wysiłków i kosztowało miliony euro), ale ryzyko ponownego pojawienia się choroby jest bardzo poważne. Zagrożenie dla Belgii jest realne!

Hodowcy trzody chlewnej są odpowiedzialni za podjęcie wszelkich niezbędnych środków, aby zapobiec wprowadzeniu choroby do swojego gospodarstwa!

Należy działać na terenie całego kraju, w szczególności podejmując następujące środki:

1. zgłaszając wszelkie podejrzenia bezpośrednio do lekarza weterynarii;
2. skrupulatnie przestrzegając zasad higieny i bezpieczeństwa biologicznego w swoim gospodarstwie;
3. kontrolując wszystkie osoby, które wchodzą na teren gospodarstwa lub w nim pracują;
4. zlecając przeprowadzenie obowiązkowej corocznej oceny bezpieczeństwa biologicznego przez lekarza weterynarii i przestrzegając ustalonego planu działania.

Informacje dotyczące wszystkich środków, których należy przestrzegać, są dostępne pod adresem

<http://www.favv-afsca.fgov.be/ppa/>



Choroba

Afrykański pomór świń jest **wysoce zaraźliwą chorobą wirusową** występującą u **świń i dzików**. Nie ma typowych objawów afrykańskiego pomoru świń. Każda nietypowa śmiertelność powinna prowadzić do podejrzenia afrykańskiego pomoru świń.

Choroba może przybierać 3 postaci:

postać ostra:

- wysoka **gorączka**, anoreksja, biegunka
- letarg, **skłonność do układania się zwierząt na sobie**
- zaburzenia hematologiczne, którym towarzyszy **krwotok podskórny i żółtaczka**
- szybka śmierć (2–3 tygodnie) i **śmiertelność**, która może wynosić prawie 100%

postać podostra: mniej nasilone objawy, niższa śmiertelność i zgon w dłuższym czasie

postać przewlekła: ostre objawy choroby występujące przez kilka miesięcy, takie jak:

- **poronienia**, małe mioty, słabe prosięta
- **niska wydajność** pod względem tuszy



Źródło: FLI



Zacierzenie skóry

Źródło: JM Gourreau

Główne drogi transmisji zachorowań

Afrykański pomór świń może rozprzestrzeniać się przez:

- **kontakt z zakażonymi świniami lub dzikami (w tym tuszami lub wnętrznościami)**
- **mięso/wędliny** pochodzące od zakażonych zwierząt
- **zanieczyszczone przedmioty**, takie jak obuwie, odzież, pojazdy, maszyny
- **osoby**, które miały kontakt z zakażonymi zwierzętami lub przebywały w regionach dotkniętych chorobą

Wirus pozostaje zaraźliwy przez długi czas w **tuszach zwierząt, otoczeniu oraz w mięsie/wędlinach** pochodzących od zakażonych zwierząt (do 105 dni w trzewiach i krwi oraz do 300 dni w mięsie suszonym!!!).

Afrykański pomór świń nie jest przenoszony na ludzi. Nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Trzy kluczowe zasady dla ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń

Prewencja

Nie ma (jeszcze) szczepionki przeciwko ASF. Jedynym sposobem zapobiegania wprowadzeniu choroby do gospodarstwa jest wdrożenie zasad higieny i **bezpieczeństwa biologicznego***, takich jak:

- stosowanie śluzu higienicznej, przestrzeganie programu zwalczania szkodników
- przestrzeganie zasad higieny przez wszystkie osoby, które wchodzi na teren gospodarstwa
- poddawanie nowych świń kwarantannie
- zakaz karmienia świń resztkami kuchennymi
- zapobieganie możliwości kontaktu świń z dzikami
- wprowadzenie zakazu dostępu do gospodarstwa jakichkolwiek osób, pojazdów lub maszyn, które miały kontakt z dzikami lub znajdowały się w strefie ryzyka w ciągu ostatnich 72 godzin
- środki te są szczególnie ważne w przypadku zatrudnienia osób pochodzących z obszaru ryzyka lub przebywających w nim (pracownicy sezonowi)
- w przypadku świń korzystających z wybiegu:
 - zastosowanie podwójnego ogrodzenia zapobiegającego możliwości kontaktu z dzikami
 - umieszczenie znaków informujących przechodniów o zakazie karmienia świń

* Zachęcamy do kontaktu z punktami kontrolnymi uprawnionymi do audytu bezpieczeństwa biologicznego

https://www.favv-afscs.be/professionnels/productionanimale/animaux/circulaires/documents/20210531_circ_instructionveterinairesanalyseederisque_FR_v1_.pdf

Wczesne wykrywanie

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek objawów przypominających afrykański pomór świń lub zwiększonej śmiertelności należy zawsze skontaktować się z lekarzem weterynarii.

W przypadku wykrycia objawów choroby w grupie świń i konieczności rozpoczęcia leczenia próbki krwi muszą zostać przesłane do laboratorium w celu ich zbadania pod kątem afrykańskiego pomoru świń.

Zawsze lepiej jest przeanalizować próbkę zbyt wiele razy niż zbyt mało!

Zwalczanie

Nie istnieje żadna metoda leczenia ASF. Zwalczanie jest prowadzone za pomocą uboju i ograniczenia przemieszczania się zwierząt.

Wprowadzone środki mają na celu jak najszybsze odizolowanie ogniska choroby, aby zapobiec jej rozprzestrzenianiu się i zwalczyć wirusa. Środki te są określone w przepisach europejskich i obejmują między innymi:

- ubój wszystkich świń w gospodarstwie i zniszczenie tuszy
- oczyszczenie i zdezynfekowanie skażonego gospodarstwa
- ustanowienie wokół ogniska chorobowego strefy ograniczeń, w której przemieszczanie się zwierząt, a także osób i towarów jest zabronione lub ograniczone

