

Țările din Europa în care există focare de PPA



Harta zonelor în care PPA este prezentă la porci și/sau mistreți (situația din 08-07-2022).

Pentru lista actualizată a țărilor cu focare sau pentru mai multe informații despre PPA:

<http://www.favv-afsca.fgov.be/ppa/>

<https://www.natuurenbos.be/afrikaansevarkenspest>

<http://www.wallonie.be/fr/actualites/mesures-de-lutte-contre-la-peste-porcine-africaine>



Pesta porcină africană (PPA) este o boală virală extrem de contagioasă a porcilor și mistreților.

Boala se răspândește rapid în Europa.

A ajuns în Belgia, la mistreți, în septembrie 2018 și a putut fi eradicată (ceea ce a necesitat eforturi enorme și a costat milioane de euro), dar riscul unei reapariții este cât se poate de prezent, iar pericolul este real pentru Belgia!

În calitate de crescător de porci, este responsabilitatea dvs. să luați toate măsurile necesare pentru a preveni pătrunderea bolii în ferma dvs.!

Peste tot în țară, trebuie să acționați, în special prin:

1. raportarea directă către medicul veterinar a oricărei suspiciuni,
2. respectarea scrupuloasă a măsurilor de igienă și biosecuritate în ferma dvs.,
3. controlarea oricui intră sau lucrează în ferma dvs.,
4. efectuarea evaluării anuale obligatorii a biosecurității de către medicul dvs. veterinar și aplicarea planului de acțiuni stabilit.

Toate măsurile de respectat pot fi consultate pe

<http://www.favv-afsca.fgov.be/ppa/>



Boala

PPA este o boală virală **extrem de contagioasă** care poate afecta **porcii și mistreții**. Nu există simptome tipice de PPA.

Orice mortalitate neobișnuită ar trebui să ducă la suspiciunea de îmbolnăvire cu PPA.

Boala poate lua 3 forme.

Forma acută:

- **febră** mare, anorexie, diaree,
- letargie, **tendință de a se îngrămădi unul peste altul**,
- tulburări hematologice însoțite de **hemoragie subcutanată și icter**,
- deces rapid (2–3 săptămâni), rata **mortalității** putându-se apropia de 100%.

Forma subacută: simptome mai puțin intense, mortalitate mai scăzută și deces într-un timp mai lung.

Forma cronică: semne evidente ale unei boli care evoluează pe parcursul mai multor luni precum,

- **avorturi**, pui mici, porci slabi,
- **performanțe slabe** la îngrășare.



Sursa: FLI



Roșeață a pielii

Sursa: JM Gourreau


Principalele căi de transmitere

PPA se poate transmite prin:

- **contact cu porcii sau mistreții infectați (inclusiv carcase sau viscere),**
- **carne/mezeluri** provenind de la animalele infectate,
- **obiecte contaminate** precum pantofi, îmbrăcăminte, vehicule, echipamente,
- **persoane** care au avut contact cu animale contaminate sau au fost în locuri contaminate.

Virusul rămâne contagios o perioadă îndelungată în cadavrele animalelor, în mediu și carne/mezeluri provenite de la animale infectate (până la 105 zile în viscere și sânge și până la 300 zile în carnea uscată!!!).

PPA nu se transmite la om.
Nu există niciun risc pentru sănătatea umană.



3 piloni pentru eradicarea PPA

Prevenirea

Nu există (încă) un vaccin împotriva PPA. Singura modalitate de a preveni pătrunderea bolii într-o fermă este implementarea măsurilor de igienă și **biosecuritate*** precum:

- folosirea unei ecluze de igienă, existența unui program de combatere a virușilor,
- respectarea scrupuloasă a măsurilor de igienă pentru toate persoanele care intră în ferma dvs,
- ținerea în carantină a porcilor noi,
- interzicerea hrănirii porcilor cu resturile de la bucătărie,
- prevenirea contactului dintre porci și mistreți,
- interzicerea accesului în fermă a oricărei persoane, vehicul sau echipament care au fost în contact cu mistreții sau care s-a aflat într-o zonă de risc în ultimele 72 ore,
- aceste măsuri sunt deosebit de importante atunci când sunt angajate persoane care provin din sau au stat într-o zonă de risc (lucrători sezonieri),
- pentru porcii care stau și în aer liber:
 - existența unui gard dublu pentru a preveni contactul cu mistreții,
 - amplasarea de pancarte prin care trecătorii să fie informați că este interzisă hrănirea porcilor.

***Nu ezitați să consultați punctele de control definite pentru auditul de biosecuritate**

https://www.favv-afscab.be/professionnels/productionanimale/animaux/circulaires/documents/20210531_circ_instructionveterinairesanalyseederisque_FR_v1.pdf

Detectarea precoce

Contactați întotdeauna medicul veterinar atunci când observați simptome care sugerează PPA sau o mortalitate anormală.

Ori de câte ori sunt detectate semne de boală la un grup de porci și este necesar să se instituie un tratament, trebuie trimise probe de sânge la laborator pentru testarea existenței PPA.

Este întotdeauna mai bine să analizați o probă de prea multe ori decât insuficient!

Lupta împotriva bolii

Nu există niciun tratament pentru PPA. Lupta se desfășoară prin măsuri de sacrificare și restricții de circulație a animalelor.

Măsurile puse în aplicare vizează izolarea cât mai rapidă a focarului pentru a preveni răspândirea bolii și a eradicarea virusului. Aceste măsuri sunt definite de legislația europeană și constau, printre altele, în:

- sacrificarea tuturor porcilor din focar și distrugerea carcaselor,
- curățarea și dezinfectarea fermei contaminate,
- amenajarea unor zone de restricție în jurul focarului, în care este interzisă sau restricționată circulația animalelor, dar și a persoanelor și mărfurilor.