

NETAPKITE AFRIKINIO KIAULIŲ MARO (AKM) PLATINTOJU!



- AKM virusas gali plisti per užkrėstą šernieną ar kiaulieną, maisto atliekas, šernų ar kiaulių gaišenas, kraują, skysčius ir kt.
- Jis gali būti pernešamas ant avalynės, drabužių, užterštų įrankių ar ratų paviršių.
- Užkrato šaltiniu gali tapti nedezinfekuota mėginiams pristatyti naudojama tara.
- AKM virusas gali išplisti, kai netinkamai transportuojant mėginius išteka skysčiai.

Afrikinio kiaulių maro virusas atsparus aplinkos veiksniams, karščiui ir šalčiui. Natūraliai rūkytoje mėsoje virusas gali išsilaikyti iki 300 dienų, šerno gaišenoje – nuo 2 iki 6 mėnesių.



MEDŽIOKLĖS ATMINTINĖ

- Sumedžiotus šernus gabenkite į jų dorojimo vietas sandariose dėžėse, maišuose ar kitaip supakuotus, kad neištekėtų skysčiai.
- Išdorojus šernus, jų dorojimo vietą, įrankius, pirminio apdoravimo aikšteles ir teritoriją aplink gyvūnų atliekų duobes išdezinfekuokite medžiagomis, veikiančiomis AKM ir klasikinio kiaulių maro sukėlėjus.
- Išdezinfekuokite tarą, kurioje buvo mėginiai, taip pat avalynę ir kitus daiktus, kurie lietsi su galimai užkrėstu šernu.
- Šernų atliekas, išskyrus trofėjus, sudėkite į gyvūninių atliekų duobę. Ji turi būti ne mažesnė kaip 2 m gylio, iškasta aukštesnėje vietoje, kurios neapsemia polaidžio ar lietaus vanduo. Pripildę duobę 1,5 m iki žemės paviršiaus, ją išvalykite arba užkaskite.
- Iš gyvūninių atliekų duobės išimti atliekas galite tik gavę VMVT teritorinio padalinio raštišką leidimą.

- Medžiotojai, kurie patys pristato mėginius AKM ir trichineliozės tyrimams, turi mėginius supakuoti taip, kad neužterštų aplinkos ar transporto priemonės virusu ir tinkamai užpildyti mėginius lydinčius dokumentus.

Radę šerno gaišeną, jos joki būdu nelieskite, o nedelsiant praneškite VMVT visą parą veikiančiu nemokamu telefono numeriu 8 800 40 403 arba kreipkitės į artimiausią VMVT teritorinį padalinį.



Daugiau informacijos apie AKM:

www.vmvt.lt



Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

