



AGENDA TERENURILOR DE VÂNĂTOARE ÎN RS



ZONELE EPIZOOTOLOGICE ALE INSTITUTELOR SPECIALIZATE ȘTIINȚIFICE ȘI DE VETERINĂ ÎN RS.



PESTA PORCINĂ AFRICANĂ ESTE O BOALĂ INFECTO –CONTAGIOASĂ, DESTUL DE PERICULOASĂ A SPECIILOR DOMESTICE ȘI SĂLBATICE DE PORCINE!

BOALA SE RĂSPÂNDEȘTE PRIN:

CONTACTUL PORCULUI INFECTAT CU CEL SĂNĂTOS; HRĂNIREA PORCILOR CU DEȘEURI ALIMENTARE CONTAMINATE; HRANĂ ȘI APĂ CONTAMINATĂ; CĂPUȘE INFECTATE; ÎMBRĂCĂMINTE ȘI ÎNCĂLȚĂMINTE; OBIECTE ȘI ECHIPAMENTE CONTAMINATE; GUNOI; MIJLOACE DE TRANSPORT; CADAVRE DE ANIMALE MOARTE SAU SACRIFICATE; ROZĂTOARE; INSECTE.

MĂSURI PREVENTIVE:

- NU ALIMENTAȚI PORCII CU DEȘEURI;- EVITAȚI ÎNTREȚINEREA PORCILOR LA PĂȘUNE;- PREVENIȚI CONTACTUL DIRECT CU MISTREȚII;- PERSOANELE CARE AU AVUT CONTACT CU MISTREȚII TREBUIE BINE SĂ SPELE ȘI DEZINFECTEZE ÎMBRĂCĂMINTEA ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEA;- ANUNȚAREA OBLIGATORIE A FIECĂRUI CAZ DE BOALĂ SAU MOARTE A PORCULUI DOMESTIC SAU MISTREȚULUI MEDICULUI VETERINAR COMPETENT;- PLASAȚI BARIERE DEZINFECTANTE LA INTRARE ȘI IEȘIRE ÎN OBIECTUL UNDE SE ȚIN PORCII.

- CUM SĂ RECUNOAȘTEȚI PESTA PORCINĂ AFRICANĂ:

MOARTEA SUBITĂ A UNUI SAU MAI MULȚI PORCI; PIERDEREA APETITULUI; APATIE; FEBRĂ RIDICATĂ PÂNĂ LA 42°C; ÎNROȘIREA PIELII (în special pe urechi, nas, coadă, picioare, stomac și părțile laterale ale corpului); DIAREE SANGUIOLENTĂ; AVORT; IMPLETICIRE ÎN DEPLASARE; DIFICULTĂȚI DE RESPIRAȚIE; TUSĂ;VOMITĂRI;

SPECIAL IMPORTANT:

- SE ÎMBOLNĂVESC TOATE CATEGORIILE DE PORCI !
- MOR TOATE ANIMALELE ÎNBOLNĂVITE
- VIRUSUL PESTEI PORCINE AFRICANE NU PREZINTĂ PERICOL PENTRU OAMENI ȘI ALTE SPECII DE ANIMALE
- NU EXISTĂ LEAC PENTRU PESTA PORCINĂ AFRICANĂ
- VACCINA NE EXISTĂ NICĂIERI ÎN LUME
- ÎN CAZUL APARIȚIEI PPA SE APLICĂ UCIDEREA TUTUROR PORCILOR DIN ENAJ.

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI MANAGEMENTUL APELOR DIRECȚIA VETERINARĂ




PESTA PORCINĂ AFRICANĂ

OBLIGAȚIILE BENEFICIARILOR TERENURILOR DE VÂNĂTOARE ȘI A VÂNĂTORILOR ÎN DESCOPERIREA LA TIMP ȘI PREVENIREA PESTEI PORCINE AFRICANE



INSTRUCȚIUNE PENTRU VÂNĂTORI



Orice morbiditate sau moartea mistrețului trebuie obligator raportată inspectorului competent de vânătoare și medicului veterinar teritorial competent pentru zona de vânătoare (cu scopul de a preleva probe pentru teste de laborator la PPA și KKS);

- De la mistreții uciși în accidente rutiere de asemenea trebuie luate eșantioane (o bucată de splină și amigdale) pentru testele de laborator la PPA și KKS,

- În zona de vânătoare, nu lăsați deșeurile care conțin reziduuri de alimente de origine animală;

- În fermele cu porci domestici, este interzisă acceptarea și păstrarea mistreților;

- Dacă dețineți porci domestici în propria gospodărie / curte, în mod obligator trebuie să schimbați îmbrăcămintea și încălțăminta după fiecare sosire din locurile de vânătoare și de la vânătoare înainte de a adăpa, hrăni sau curăți la porcii proprii;

- Mutarea mistreților în terenuri de vânătoare împrejmuite (de ex. gateri, terenuri de reproducere) sau transferul mistreților în natură liberă (așa-numitele "terenuri de vânătoare deschise") trebuie raportate inspectorului veterinar competent.

- În grădinile zoologice, este obligatoriu să se raporteze inspectorului veterinar competent orice boală detectată sau deces;

- Cereți vânătorilor care vin din țările infectate cu PPA să nu aducă cu ei alimente preparate din carne originală de porc domestic și mistreț. PPA adesea se transmite prin alimente contaminate;



- Lucrătorii care lucrează la ferme de porci sau în ferme mari de porci și care se ocupă cu vânătoria înainte de începerea muncii sunt obligați să raporteze conducătorului fermei că au participat la o astfel de vânătoare, în care au observat comportamentul nefiresc sau suspectă boala la mistreții sălbatici,

- Să evalueze numărul turmelor de mistreți, numărul lor și densitatea populației de mistreți din zona de vânătoare și să le monitorizeze mișcarea și orice schimbare, deoarece "pierderea" - dispariția anumitor turme de mistreți poate fi primul semn de PPA;

- Realizarea monitorizării permanente la punctele de alimentare, troacă. Controlul lor sistematic poate furniza date importante despre mișcarea infecției;

- Este obligatoriu să se efectueze monitorizarea prescrisă a bolilor PPA și KKS la mistreții sălbatici și, prin urmare, este obligatorie trimiterea probelor în număr prescris din fiecare zonă de vânătoare către Institutul Veterinar competent în cursul anului;

- Dacă mistreții sunt împușcați se ia sânge din inimă (dacă nu este posibil atunci dintr-un vas sângvin mare) neapărat și o bucată de amigdale (tonsile) și splină. După finalizarea Ghidului de analiză a eșantioanelor, probele trebuie trimise la Institutul Veterinar competent, care vor efectua analiza și la prezența agentului patogen al PPA.

**MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI
MANAGEMENTUL APELOR
DIRECȚIA VETERINARĂ**